

# تأثیر داروی زولدرونیک اسید در بیان و متیلاسیون ژن BSP در طول تمایز استئوبلاستیک سلولهای بنیادی مزانشیمی

مجید فرش دوستی حق<sup>۱</sup>، دکتر مهرداد نوروزی نیا<sup>۲</sup>، دکتر یوسف مرتضوی<sup>۳</sup>،  
دکتر مسعود سلیمانی<sup>۴</sup>، دکتر سعید کاویانی<sup>۴</sup>، مریم محمودی نیا میمند<sup>۵</sup>

## چکیده

**زمینه و هدف:** سیالو پروتئین استخوانی (BSP) شاخص اختصاصی تمایز استئوبلاستیک می‌باشد. در این تحقیق تاثیر زولدرونیک اسید بر بیان BSP مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین به منظور درک مکانیسم‌های کنترلی بیان ژن، وضعیت متیلاسیون پروموتور BSP مورد بررسی قرار گرفت.

**روش بررسی:** در این مطالعه تجربی جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSCs) از معز استخوان انسانی صورت گرفت. پس از تغییر، تحت تیمار با زولدرونیک اسید قرار گرفتند و سپس به مدت ۳ هفته در محیط تمایزی کشت داده شدند. استخراج DNA و RNA از MSCs و سلولهای تمایز یافته استئوبلاستی صورت گرفت. بیان BSP با استفاده از RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. وضعیت متیلاسیون پروموتور ژن BSP، پس از تیمار DNA با سدیم بی سولفات (SBS)، با استفاده از پرایمرهای متیله (M) و غیرمتیله (U) در آزمون MSP مشخص شد.

**یافته‌ها:** بیان BSP در سلولهای تمایز یافته استئوبلاستی بواسطه تیمار با زولدرونیک اسید قابل مشاهده بود ولی در سلولهای بنیادی مزانشیمی قابل مشاهده نبود. بررسی با روش MSP نشان داد که ژن BSP در طول تمایز در وضعیت دمتیلاسیون کامل قرار داشت.

**نتیجه کلی:** بیان BSP از هفته اول تمایز به خوبی قابل ارزیابی بوده و این نشان دهنده تسریع تمایز استئوبلاستی بواسطه تیمار با زولدرونیک اسید می‌باشد. وضعیت دمتیلاسیون BSP نشان دهنده عدم تاثیر زولدرونیک اسید بر وضعیت متیلاسیون این ژن می‌باشد. سایر مکانیسم‌های ژنتیکی و یا اپی ژنتیکی بیان BSP را در طول تمایز استئوبلاستی سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید تحت کنترل دارند.

**واژه‌های کلیدی:** سلولهای بنیادی مزانشیمی، زولدرونیک اسید، تمایز استئوبلاستی، BSP، متیلاسیون DNA

- دریافت مقاله: بهمن ۸۹ - پذیرش مقاله: اردیبهشت ۹۰

## مقدمه

پروتئین‌های ماتریکس غیر کلازنی بافت استخوانی نقش مهمی را در ارگانیزاسیون ماتریکس کلازنی، تشکیل و رشد کریستالهای هیدروکسی آپاتیت ایفا می‌کنند.

عمده‌ترین پروتئین‌های ماتریکس غیر کلازنی شامل گلیکوپروتئین‌های کندورینین سولفات دکورین (Decorin) و بای گلیکان (Biglycan)، سیالو پروتئین‌های استئوبوتین و سیالوپروتئین استخوانی (BSP)، استئوکلسین و استئونکتین می‌باشند<sup>(۱)</sup>. برای اولین بار از استخوان کورتیکال گاوی در سال ۱۹۷۲ توسط Kent و Herring جداسازی شد که یک گلیکوپروتئین ۲۳KDa با محتوای بالای اسید سیالیک است.

<sup>۱</sup> کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس  
<sup>۲</sup> استادیار گروه ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس  
<sup>۳</sup> دانشیار گروه هماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
<sup>۴</sup> استادیار گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس  
<sup>۵</sup> کارشناسی ارشد زیست سلولی مولکولی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی بیمارستان صارم

با توجه به اهمیت متیلاسیون اختصاصی ژن‌ها (Gene Specific Methylation) در بیان ژن‌ها، تعیین وضعیت متیلاسیون ژن‌های اختصاصی استئوپلاستیک همانند BSP حائز اهمیت خواهد بود.

زولدرونیک اسید جزو دسته دارویی بی فسفانات‌ها بوده و برای پیشگیری از شکستگی‌های استخوان در سرطان و همچنین در استئوپوروز کاربرد دارد(۱). در سال ۲۰۰۷، اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) مجوز استفاده از این دارو جهت درمان استئوپوروز در زنان یائسه را صادر کرد. تحقیقات نشان داده است که مصرف زولدرونیک اسید میزان شکستگی مهره‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و دانسیته استخوان‌ها را بهبود می‌بخشد(۷).

مکانیسم اثر این دارو مهار استئوکلاست‌ها و القا تمايز استئوپلاست‌ها می‌باشد(۸). فعالیت اخیر این دارو در القا تمايز استئوپلاستیک سلولهای بنیادی مزانشیمی و مکانیسم تاثیر آن بر روی بیان ژن‌های اختصاصی استئوپلاستی مشخص نمی‌باشد. تحقیقات نشان داده است که بیان BSP در طول تمايز استئوپلاستی سلولهای بنیادی مزانشیمی رت افزایش می‌یابد(۹).

همچنین تیمار سلول‌های شبه استئوپلاستی-2 (Saos-2) با داروی زولدرونیک اسید که در درمان استئوپوروز کاربرد دارد، منجر به افزایش بیان BSP در این سلولها می‌گردد(۱۰). همچنین تحقیقات نشان داده‌اند که BSP یک مارکر بیوشیمیایی اختصاصی برای متabolism استخوان در زنان یائسه می‌باشد(۱۱).

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر داروی زولدرونیک اسید در بیان ژن سیالوپروتئین استخوانی (BSP) در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی تیمار شده با این دارو است. همچنین به منظور شناخت بیشتر مکانیسم‌های اپی ژنتیک احتمالی موثر در القا بیان BSP در سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید، وضعیت متیلاسیون

BSP به میزان بالایی در بافت‌های استخوانی تازه تشکیل شده بیان می‌شود و به عنوان هسته تشکیل دهنده هیدروکسی آپاتیت و مارکر اختصاصی تمايز استئوپلاست‌ها مطرح می‌باشد. در عین حال ویژگی‌های اتصال سلولی و سیگنال دهی سلولی BSP، نقش‌های متعددی را برای این پروتئین در تغییر ساختار (Remodeling) استخوان و همچنین در پاتولوژی بیماری‌های مختلف ایجاد می‌کند.

حضور BSP در ماتریکس کلاژنی یک فاکتور میتوژنیک برای پری استئوپلاست‌ها بوده و تمايز آنها را به استئوپلاست تسريع کرده و در نتیجه کلیسیفیکاسیون استخوان را تحریک می‌کند(۲). بیان BSP اختصاصی بافت‌های میترالیزه مانند استخوان، غضروف‌های میترالیزه، عاج دندان و سمنتوم است(۳). بیان محدود ژن BSP به این مطلب اشاره دارد که نسخه برداری ژن در حالت نرم‌الزین مهار شده می‌باشد. این مهار می‌تواند به علت اتصال نوکلئوزم، متیلاسیون نوکلئوتیدها، نیاز به فاکتورهای نسخه برداری اختصاصی جهت القا بیان یا ترکیبی از این مکانیسم‌ها باشد. یکی از مکانیسم‌های کنترل بیان ژن، فرایندهای اپی ژنتیکی می‌باشد که شامل متیلاسیون DNA، عمدتاً در نواحی پرومотор ژن‌ها و مدیفیکاسیون‌های هیستونی اعم از استیلاسیون، داستیلاسیون، متیلاسیون، فسفوریلاسیون و غیره می‌باشد. متیلاسیون به DNA واسطه افزودن گروه متیل بر روی سیتوزین در جزایر CpG اعمال می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که وضعیت هیپومتیلاسیون با افزایش بیان و وضعیت هیپرمتیلاسیون با کاهش یا خاموشی بیان ژن همراه است(۴). گروه تحقیقاتی ما نشان دادند که وضعیت متیلاسیون ژن ROR2 در طول تمايز استئوپلاستی تغییر پیدا می‌کند(۵). تغییرات اپی ژنتیکی بعد قابلیت تغییر در مقایسه با تغییرات ژنتیکی هدف‌های مناسب‌تری در ایجاد درمان‌های جدید می‌باشند.

گلیسرول فسفات با غلظت نهایی  $5\text{ mM}$  و آسکوربیات  $2\text{-}50\text{ }\mu\text{g/ml}$  فسفات با غلظت نهایی  $50\text{ }\mu\text{g/ml}$  اضافه گردید. برای تایید ماهیت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مارکرهای شاخص این سلول‌ها با استفاده از فلوسیتوومتری مورد ارزیابی قرار گرفتند(۱۳).

#### تیمار سلول‌های بنیادی مزانشیمی با داروی زولدرونیک اسید

زولدرونیک اسید به صورت ویال حاوی  $4\text{ mg}$  پودر لیوفلیزه از شرکت دارویی Novartis تهیه گردید. این دارو در آب محلول بوده و نیز قابلیت انحلال در محیط کشت را دارد. از غلظت نهایی  $5\text{ }\mu\text{M}$  در محیط کشت برای تیمار ضربانی (Pulse Treatment) سلول‌های بنیادی مزانشیمی استفاده شد. القاء تمایز استئوپلاستی hMSC در فلاسک‌های TV5 انجام شد.

تیمار MSCs با داروی زولدرونیک اسید در  $40\text{-}40\%$  Confluency MSCs تحت تیمار ضربانی با  $5\text{ }\mu\text{M}$  داروی Zolendronate اسید به مدت ۳ ساعت قرار گرفتند(۱۴). بعد از تیمار به مدت ۳ ساعت، محیط کشت تخلیه شده و با PBS شستشو داده شد. سپس محیط تمایزی بر روی آنها اضافه شد و به مدت ۲۱ روز کشت داده شدند. سلول‌های بنیادی مزانشیمی بدون تیمار به عنوان کنترل کشت داده شدند.

#### رنگ آمیزی آلیزارین رد

تایید تمایز استئوپلاستی با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین صورت گرفت. برای انجام این رنگ آمیزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی در پلیت‌های ۶ خانه ای کشت داده شدند.

بخشی از سلول‌ها با زولدرونیک اسید تیمار شدند و گروهی هم به عنوان کنترل بدون تیمار کشت داده شدند. رنگ آمیزی آلیزارین رد در روز ۲۱ کشت انجام گرفت. برای انجام رنگ آمیزی محیط کشت تخلیه شده و سلولها با PBS شستشو شدند. سپس

ژن BSP در طول تمایز استئوپلاستیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید با استفاده از روش MSP مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

#### روش بررسی

##### جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی

پس از کسب رضایت از یک اهدا کننده سالم حدود  $10\text{ ml}$  از مغز استخوان انسانی در یک لوله هپارینه در بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی تهیه گردید. سلول‌های تک هسته‌ای با استفاده از فایکول و سانتریفوژ شب غلطی جداسازی شدند. سلول‌های تک هسته‌ای با بافر HBSS شستشو شده و در فلاسک کشت سلول TV5 به همراه  $20\text{ ml}$  محیط کشت (Gibco) DMEM-low glucose و  $10\text{ \% FBS}$  و  $100\text{ }\mu\text{g/ml}$  پنیسیلین و  $100\text{ U/ml}$  استرپتومایسین در انکوباتور  $37^\circ\text{C}$  با  $5\text{ \% CO}_2$  به مدت یک شب کشت داده شدند(۱۲). قبل از انجام کشت، سلول‌های تک هسته‌ای شمارش شده و درصد زنده بودن (Viability) آن‌ها تعیین شد. برای انجام شمارش سلولی  $10\text{ }\mu\text{l}$  از سوسپانسیون سلولی با  $10\text{ }\mu\text{l}$  تریپان بلو مخلوط شده و با لام نتوبار شمارش شدند. روز بعد فلاسک از محیط کشت خالی شده و سلول‌های چسبنده به سطح فلاسک سه بار با  $20\text{ ml}$  بافر PBSA شستشو داده شدند. سلول‌ها تعویض محیط شده و حدود یک هفته کشت داده شدند تا به  $70\text{-}70\%$  رسیده و سپس با تریپسین جدا شده و پاساژ داده شدند. در پاساژ ۲-۳ تمایز استئوپلاستیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی انجام شد. محیط تمایزی استئوپلاستی حاوی محیط کشت عمومی DMEM-L-گلوتامین و  $10\text{ \% FBS}$  بوده که به آن فاکتورهای تمایزی دگراماتازون با غلظت نهایی  $10\text{ nM}$ ، بتا

از سانتریفوژ و حذف DNA ژنومی، اتانول اضافه شده بر روی ستون استخراج RNA منتقل شدند. پس از چندین مرحله شستشو، با افزودن RNase-free water به ستون و سانتریفوژ RNA استخراج شد. قبل از ستز cDNA تمامیت (Integrity) RNA با الکتروفورز بر روی ژل آگارز سنجیده شد.

#### تیمار Sss1 با SBS و آنزیم

قبل از انجام DNA MSP استخراج شده با SBS تیمار شد. برای این منظور  $10\text{ }\mu\text{l}$  DNA (حدود  $1\text{ }\mu\text{g}$ ) به  $1\text{ }\mu\text{l}$  آب مقطر دیونیزه اضافه شد و  $5/5$  میکرولیتر  $27^\circ\text{C}$   $2\text{NaOH}$  مولار با آن افزوده و  $20$  دقیقه در

انکوبه شد. به ترتیب  $30\text{ }\mu\text{l}$  هیدروکینون  $10\text{ mM}$  تازه تهیه شده و  $50\text{ }\mu\text{l}$  سدیم بی سولفايد  $3\text{M}$  تازه تهیه شده به تیوب اضافه شد و نهایتاً به کمک روغن معدنی سطح محلول پوشانده شد. سپس  $16$  ساعت در دمای  $50^\circ\text{C}$  انکوبه شد. DNA با استفاده از کیت Roche از محلول استخراج شد.

در این مرحله دسولفوناسیون (Desulfonation) بر روی DNA انجام می‌گیرد. برای این منظور  $22\text{ }\mu\text{l}$  از  $3\text{ M NaOH}$  در دمای اتاق انکوبه شد. سپس DNA به روش اتانول استات آمونیوم رسوب کرده و در  $30\text{ }\mu\text{l}$  آب مقطر دو بار تقطیر حل می‌شود. برای تهیه DNA متیله به عنوان کنترل مثبت از آنزیم Sss1 شرکت New England Biolabs بر اساس پروتکل پیشنهادی کیت استفاده شد(۱۵). بدین منظور  $6\text{ }\mu\text{l}$  DNA خون محیطی به همراه  $10\text{ }\mu\text{l}$  بافر  $10\text{X}$ ,  $0.5\text{ }\mu\text{l}$ - آدنوزیل متیونین  $100\text{ }\mu\text{l}$ ,  $2\text{ }\mu\text{l}$  آنزیم Sss1 با آب مقطر به حجم  $32\text{ mM}$  رسید. مخلوط متیلاسیون به مدت  $1/5$  ساعت در دمای  $37^\circ\text{C}$  انکوبه شد. سپس DNA متیله با استفاده از کیت، استخراج شد. DNA متیله حاصل به عنوان کنترل مثبت در MSP با پرایمر متیله (M) مورد استفاده قرار گرفت.

سلولها با فرمالدهید  $40\%$  فیکس شده و مجدد با PBS شستشو شدند. رنگ آلیزارین رد  $1\%$  اضافه شده و به مدت  $30$  دقیقه انکوبه شدند. نهایتاً با آب مقطر شستشو شده و در زیر میکروسکوپ از نظر وجود رسوب‌های قرمز رنگ کلسیم مورد ارزیابی قرار گرفتند.

#### استخراج RNA و DNA

استخراج DNA از سلول‌های بنیادی مزانشیمی و تمایز یافته استئوبلاستی در هفته اول، دوم و سوم با استفاده از کیت استخراج DNA شرکت Roche بر اساس پروتکل پیشنهادی کیت انجام گرفت.

بر اساس این پروتکل و به طور خلاصه، سلولها تریپسینه شده و پس از شستشو در  $200\text{ }\mu\text{l}$  PBS سوسپانسیون شدند. حدود  $4\times 10^7$  سلول از هر فلascok T75 استحصال شد. سپس  $200\text{ }\mu\text{l}$  بافر  $40\text{ }\mu\text{l}$  پروتئیناز K افزوده شده و  $10$  دقیقه در دمای  $70^\circ\text{C}$  انکوبه شدند.  $100\text{ }\mu\text{l}$  ایزوپروپانول اضافه شده و به فیلتر تیوب منتقل شده و سانتریفوژ شدند. فیلتر تیوب یک مرحله با بافر Inhibitor و مرحله با بافر شستشو، شستشو داده شد.

نهایتاً  $50\text{ }\mu\text{l}$  بافر Elusion اضافه شده و سانتریفوژ می‌گردد و بدین ترتیب DNA استخراج می‌گردد. DNA استخراج شده به منظور ارزیابی کیفیت بر روی ژل آگارز بررسی شد. مقدار DNA استخراج شده بواسطه جذب در طول موج  $260\text{ nm}$  اندازه گیری شد. خلوص DNA استخراج شده با نسبت جذب در طول موج  $260\text{ nm}$  به  $280\text{ nm}$  سنجیده شد.

سلول‌های بنیادی مزانشیمی و MSC‌های تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید در هفته اول، دوم و سوم با استفاده از RNAeasy plus Mini Kit شرکت Qiagen بر اساس پروتکل پیشنهادی کیت استخراج شدند. به طور خلاصه، سلولها لیز و هموژنیزه شده و بر روی ستون gDNA Eliminator منتقل شدند. پس

مدت ۵ دقیقه، ۳۰ سیکل  $95^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳۰ ثانیه،  $62^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳۰ ثانیه،  $72^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳۰ ثانیه و نهایتاً یک سیکل  $72^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵ دقیقه می‌باشد. قطعه تکثیر شده با الکتروفورز بر روی ژل آگارز بررسی شد. RT-PCR برای هر یک از نمونه‌ها حداقل سه بار تکرار شد.

### MSP

با استفاده از پرایمرهای اختصاصی متیله(M) و غیر متیله(U) که قادر به تشخیص DNA متیله و غیر متیله هستند PCR اختصاصی متیلاسیون(MSP) انجام شد. پرایمرها با استفاده از نرم افزار آنلاین Methprimer طراحی شدند(۱۶).

پرایمرهای مورد استفاده برای تشخیص متیلاسیون در جدول ۱ آورده شده است. واکنش PCR شامل مخلوط بافر X،  $10\text{ }\mu\text{l}$  مخلوط dNTP(هر کدام  $25\text{ mM MgCl}_2$ ،  $0.5\text{ }\mu\text{M}$  پرایمرها)،  $0.5\text{ }\mu\text{M}$  Taq DNA Polymerase و  $1/25$  واحد آنزیم DMSO ( $1/4-1/10\text{ }\mu\text{l}$ ) در حجم نهایی  $25\text{ }\mu\text{l}$  تهیه شد. MSP برای هر یک از نمونه‌ها حداقل سه بار تکرار شد.

### سنتر cDNA و انجام RT-PCR

سنتر cDNA با استفاده از  $1\text{ }\mu\text{l}$  RNA استخراج شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای تمایز یافته استئوبلاستی انجام گرفت.

مخلوط واکنش برای سنتر cDNA شامل  $20\text{ pmol}$  cDNA،  $250\text{ mM}$  پرایمر راندوم هگزامر،  $1\text{ }\mu\text{l}$  بافر X(محتوی  $5\text{ mM MgCl}_2$ ،  $20\text{ mM KCl}$ ،  $250\text{ mM Tris-HCl}$ ،  $10\text{ mM dNTP}$ ،  $1\text{ }\mu\text{l}$  آنزیم ترانس کربپتاز (Fermentase) M-MuLV) که به حجم نهایی  $1\text{ }\mu\text{l}$  رسید. برنامه دمایی برای واکنش نسخه برداری معکوس  $42^{\circ}\text{C}$  به مدت ۶۰ دقیقه بود. غیر فعالسازی آنزیم بواسطه حرارت  $70^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۰ دقیقه صورت گرفت.

برای انجام RT-PCR از پرایمرهای اختصاصی استفاده شد که توالی آنها در جدول ۱ آمده است. حجم نهایی واکنش برای انجام RT-PCR  $25\text{ }\mu\text{l}$  بود. مخلوط واکنش محتوی  $10\text{ pmol}$  پرایمر،  $0.5\text{ }\mu\text{l}$  cDNA،  $0.5\text{ }\mu\text{l}$  آنزیم پلیمراز Taq DNA و بافر  $10\text{ X }$  PCR dNTP( $2.5\text{ mM}$  دستگاه ترمال سایکلر شامل یک سیکل  $95^{\circ}\text{C}$  به

### جدول ۱: توالی پرایمرهای M و U و RT


نام پرایمر	توالی پرایمر	اندازه باند(bp)
BSPMF	CGATTCTGAGCGGTAGATGTAC	۱۰۷
BSPMR	ACGAAACGCAAAAAAATACG	۱۱۰
BSPUF	GTGATTGTAGTGGTAGATGTATGA	
BSPUR	AAACAAAACACAAAAAAATACAAA	
BSP(RT)F	TGCCTTGAGCCTGCTTCCT	۷۹
BSP(RT)R	CTGAGCAAAATTAAAGCAGTCTCA	

### یافته‌ها


رنگ آمیزی آلیزارین رد در سلولهای تمایز یافته استئوبلاستیک با رنگ آمیزی آلیزارین رد توده‌های کلیسمی در این رنگ آمیزی به رنگ قرمز دیده می‌شوند که نشان دهنده تمایز استئوبلاستیک سلولهای بنیادی مزانشیمی می‌باشد.

تایید تمایز استئوبلاستیک با رنگ آمیزی آلیزارین رد توده‌های کلیسمی در این رنگ آمیزی به رنگ قرمز دیده می‌شوند که نشان دهنده تمایز استئوبلاستیک سلولهای بنیادی مزانشیمی می‌باشد.

مشاهده نشد(تصویر ۱.ب).



سلول‌های بنیادی مزانشیمی برای این رنگ آمیزی منفی بودند و هیچ گونه رسوپ کلسیم در آنها




تصویر ۱: رنگ آمیزی آلizarین رد

الف: سلول‌های تمایز یافته استئوبلاستیک تیمار شده با زولدرونیک اسید در روز ۲۱ تمایز

ب: سلول‌های بنیادی مزانشیمی

قرار گرفت. نتایج RT-PCR برای سلول‌های بنیادی مزانشیمی منفی بوده، درحالیکه برای سلول‌های استئوبلاستی در هفته اول، دوم و سوم تمایز مثبت می‌باشند(تصویر ۲). بر این اساس BSP در سلول‌های بنیادی مزانشیمی بیان نمی‌شود ولی با القاء تمایز، بیان BSP از هفته اول تمایز به بعد قابل مشاهده است.

وضعیت بیان **BSP** در تمایز استئوبلاستیک **MSCs** تیمار شده با زولدرونیک اسید به منظور درک بهتر تاثیر داروی زولدرونیک اسید بر روی بیان BSP و همچنین به منظور بررسی ارتباط mRNA بین وضعیت متیلاسیون ژن BSP و بیان آن، ژن BSP با استفاده از روش RT-PCR مورد ارزیابی



تصویر ۲: نتایج RT-PCR ژن BSP اندازه باند ۷۹bp

(+) cDNA سلول‌های بنیادی مزانشیمی تمایز یافته

(-) cDNA سلول‌های تمایز یافته استئوبلاستی به ترتیب روزهای ۰، ۷، ۱۴ و ۲۱ تمایز


100 bp ladder (L)

می‌باشند. در این تحقیق تاثیر داروی زولدرونیک اسید بر روی متیلاسیون پروموتور BSP مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج MSP با پرایمر U برای ژن BSP در سلول‌های استئوبلاستی تمایز یافته و سلول‌های بنیادی مزانشیمی مثبت بود. در حالیکه نتایج MSP با پرایمر

وضعیت متیلاسیون **BSP** در تمایز استئوبلاستیک **MSCs** تیمار شده با زولدرونیک اسید مکانیسم‌های اپی ژنتیک همانند تغییر متیلاسیون ژنوم، مدیفیکاسیون‌های هیستونی و غیره جزو مکانیسم‌های اصلی کنترل بیان ژن در فرایندهای مختلف سلولی

تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید در سلول‌های استئوپلاستی و سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشابه می‌باشد و تمایز استئوپلاستی با تغییر متیلاسیون این ژن همراه نیست (تصویر ۳).

M برای ژن BSP هم در سلول‌های بنیادی مزانشیمی و هم در سلول‌های استئوپلاستی تمایز یافته منفی بود. این نتایج وضعیت دمتیلاسیون کامل ژن BSP را نشان می‌دهد. در عین حال الگوی متیلاسیون ژن BSP در طول تمایز استئوپلاستیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی



تصویر ۳: نتایج MSP با پرایمرهای M(متیله) و U(غیرمتیله) بر روی ژن BSP

- الف: MSP با پرایمر M برای ژن BSP با اندازه باند ۱۰۷bp (۰): سلول‌های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته.  
 ۲۱ و ۱۴ و ۷): سلول‌های تمایز یافته استئوپلاستی به ترتیب روزهای ۷ و ۱۴ و ۲۱ تمایز (L)  
 ۱۰۰bp ladder :  
 (P): کنترل مثبت(DNA خون محيطي تیمار شده با Sss1 و SSB) (U): بدون DNA  
 (N): بدون SBS
- ب: MSP با پرایمر U برای ژن BSP با اندازه باند ۱۱۰bp (۰): سلول‌های بنیادی مزانشیمی تمایز نیافته  
 ۲۱ و ۱۴ و ۷): سلول‌های تمایز یافته استئوپلاستی به ترتیب روزهای ۷ و ۱۴ و ۲۱ تمایز (L)  
 ۱۰۰bp ladder :  
 (P): کنترل مثبت(DNA خون محيطي تیمار شده با SBS) (U): بدون DNA  
 (N): بدون SBS

داروهای جدیدی توسعه پیدا کرده‌اند که مکانیسم اثر آنها مهار استئوکلاستها به همراه القاء تمایز استئوپلاستها می‌باشد. زولدرونیک اسید به عنوان یک بی‌فسفونات نسل سوم جزو این دسته از داروها بوده که برای پیشگیری از شکستگی‌های اسکلتی در بیماران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد (۱۹). در سال ۲۰۰۷، FDA مجوز استفاده از این دارو جهت درمان استئوپورز در زنان یائسه را صادر کرد. تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف زولدرونیک اسید در زنان یائسه میزان شکستگی مهره‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و دانسته استخوان را بخوبود می‌بخشد (۷). زولدرونیک اسید فعالیت مهار بازجذب

## بحث

استئوپورز شایعترین بیماری استخوان در جهان می‌باشد که با کاهش توده استخوانی و افزایش شکنندگی استخوان‌ها همراه است. ۵۰ درصد زنان و ۲۰ درصد مردان بالای ۵۰ سال در معرض ابتلاء به استئوپورز قرار دارند (۱۷). این عارضه سالانه هزینه‌های درمانی بسیار بالایی را بخود اختصاص می‌دهد. درمان‌های رایج استئوپورز عمدها بر اساس مهار بازجذب استخوان از طریق مهار عملکرد استئوکلاست‌ها می‌باشد (۱۸).

داروهایی که استئوکلاست‌ها را مهار می‌کنند تنها بازجذب استخوان را مهار کرده و نمی‌توانند منابع استخوانی از دست رفته را احیا کنند. در مقابل،

در چسبندگی سلولی نقش دارد. جایگاه ژنی BSP انسانی (IBSP) بر روی بازوی بلند کروموزوم شماره ۴ قرار گرفته است<sup>(۲۷)</sup>. قابل توجه اینکه جایگاه ژنی غالب پروتئین‌های ماتریکس استخوانی در همین ناحیه واقع است<sup>(۲۸)</sup>.

ژن‌های BSP، استئوپونتین (OPN)، پروتئین ماتریکس عاج دندان (DMP1) و سیالوفسفوپروتئین عاج دندان (DSPP) در یک ناحیه ژنی به طول ۶۰۰ Kb بر روی بازوی بلند کروموزوم شماره ۴ واقع هستند که پروتئین‌هایی را تولید می‌کنند که از نظر عملکردی و ساختاری مشابه هم هستند و در تنظیم میزالیزاسیون و چسبندگی سلولی دارای نقش می‌باشند.

بیان BSP عمدها در ماتریکس میزالیزه استخوان دیده می‌شود. میزان بیان mRNA BSP در پری استئوبلاست‌ها خیلی اندک بوده و ردیابی آن مشکل می‌باشد، در حالیکه بیان آن در استئوبلاست‌ها و استئوسیت‌ها افزایش یافته و به خوبی قابل ارزیابی است<sup>(۲۹)</sup>. این مطلب مؤید یافته‌های ما می‌باشد که نشان می‌دهد بیان BSP از هفته اول تمایز استئوبلاستی یعنی مرحله پری استئوبلاستی آغاز می‌شود و در هفته‌های دوم و سوم تمایز استئوبلاستی که سلولهای بالغ استئوبلاست و استئوسیت تشکیل می‌شوند بیان BSP به خوبی قابل ردیابی است. در عین حال یافته‌های قبلی نشان می‌دهند که بیان در مرحله پری استئوبلاستی خیلی اندک است ولی یافته‌های ما نشان می‌دهد که بیان BSP در هفته اول تمایز به خوبی قابل ارزیابی بوده و این نشان دهنده تسریع تمایز استئوبلاستی بواسطه تیمار با داروی زولدرونیک اسید می‌باشد. بر این اساس و همچنین یافته‌های قبلی داروی زولدرونیک اسید بیان BSP را در تمایز استئوبلاستی سلول‌های بنیادی مزانشیمی افزایش می‌دهد<sup>(۲۶)</sup>.

استخوان را بواسطه مهار بلوغ استئوكلاست‌ها، مهار فراخوانی استئوكلاست‌ها به موضع باز جذب استخوان، مهار عملکرد استئوكلاست‌های بالغ، کاهش تولید سیتوکین‌ها همانند IL-1، فعالیت آنتی توموری مستقیم (سیتواستاتیک و سیتولیتیک)، مهار انتشار، تهاجم و چسبندگی به ماتریکس استخوانی سلول‌های توموری اعمال می‌کند<sup>(۲۰-۲۴)</sup>. زولدرونیک اسید علاوه بر استئوكلاست‌ها، منجر به القاء تمایز استئوبلاستی می‌شود ولی مکانیسم اثر این دارو در القاء تمایز استئوبلاستی به خوبی شناخته نشده است. تاثیر ضربانی زولدرونیک اسید به مدت ۳ تا ۶ ساعت در غلاظت ۵ $\mu$ M و سپس کشت به مدت ۲ هفته تحت شرایط استئوژنیک منجر به القاء تمایز استئوژنیک در hMSC می‌شود<sup>(۱۴)</sup>. همچنین تحقیقات نشان دادند که بیان ژن‌های شاخص استئوژنیک همانند استئوکلسین و استئوپونتین به دوز داروی زولدرونیک اسید بستگی دارد بطوریکه با کاهش دوز داروی زولدرونیک اسید بیان استئوکلسین و استئوپونتین در طول تمایز استئوبلاستیک کاهش پیدا می‌کند<sup>(۲۵)</sup>. بر این اساس شناخت تاثیر زولدرونیک اسید بر روی بیان ژن‌های شاخص استئوبلاستی همانند سیالوپروتئین استخوانی و مکانیسم اثر آن حائز اهمیت خواهد بود.

سیالوپروتئین استخوانی (BSP) حدود ۸-۱۲٪ از پروتئین‌های غیر کلارنی در استخوان را تشکیل می‌دهد. BSP یک مولکول شدیداً گلیکوزیله می‌باشد که حدود ۵۰٪ وزن مولکولی آنرا کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌دهند که کربوهیدرات‌های عده آن شامل اسید سیالیک، گلوکز آمین و گالاكتوز آمین می‌باشد<sup>(۲۶)</sup>. سیالوپروتئین استخوانی دارای ۳۲۷ اسید آمینه بوده که ناحیه N ترمینال آن در اتصال به هیدروکسی آپاتیت نقش دارد. همچنین این پروتئین دارای توالی RGD در انتهای کربوهیدراتیکی می‌باشد که

بنیادی مزانشیمی تیمار شده با داروی زولدرونیک اسید تحت کنترل دارند.

### نتیجه گیری

در این تحقیق مشخص شد که داروی زولدرونیک اسید بیان BSP را افزایش می‌دهد ولی تغییری در الگوی متیلاسیون پرموتور این ژن ایجاد نمی‌کند. این مطلب نشان می‌دهد که داروی زولدرونیک اسید با استفاده از مکانیسم‌های سلولی دیگری به غیر از متیلاسیون پرموتور BSP، منجر به افزایش بیان این ژن می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که به منظور درک بهتر القاء تمایز استئوپلاستی به واسطه داروی زولدرونیک اسید، سایر مکانیسم‌های ژنتیکی و یا اپی ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرند.

### تشکر و قدردانی

این تحقیق مستخرج از پایان نامه دکترای رشته خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و با حمایت مالی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

از نمایندگی شرکت نوارتیس و آقای دکتر جعفری بدليل تامین داروی زولدرونیک اسید و مرکز تحقیقات سلولی ملکولی و سلول‌های بنیادی صارم بدليل در اختیار گذاشتن آزمایشگاه و بعضی از مواد، نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

اما بیان محدود بافتی BSP نشان دهنده این مطلب است که نسخه برداری این ژن در حالت نرم‌الخاموش می‌باشد. این مهار می‌تواند به علت اتصال نوکلئوزوم، متیلاسیون نوکلئوتیدها، نیاز به فاکتورهای نسخه برداری اختصاصی جهت القاء بیان یا ترکیبی از این مکانیسم‌ها باشد. تحقیقات برای نشان دادن اتصال نوکلئوزوم به ناحیه پرموتور BSP، با استفاده از حساسیت به DNase-1، هیچگونه تفاوتی را بین سلول‌های بیان کننده BSP و سلول‌هایی که BSP را بیان نمی‌کردند، نشان نداد (۳۰). بیان BSP تحت تاثیر داروی زولدرونیک اسید در طول تمایز استئوپلاستیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی می‌تواند متأثر از سایر مکانیسم‌های اپی ژنتیک باشد.

در این تحقیق وضعیت متیلاسیون ژن BSP در طول تمایز استئوپلاستیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با زولدرونیک اسید مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که ناحیه پرموتور ژن BSP در سلول‌های بنیادی مزانشیمی و سلول‌های استئوپلاستیک تمایز یافته در وضعیت دمتیلاسیون کامل قرار دارد. بر این اساس تمایز استئوپلاستی تاثیری بر روی وضعیت متیلاسیون این ژن ندارد و بیان این ژن متأثر از تغییر متیلاسیون نمی‌باشد.

احتمالاً سایر مکانیسم‌های ژنتیکی و یا اپی ژنتیکی بیان BSP را در طول تمایز استئوپلاستی سلول‌های

### منابع

1. Camozzi V, Vescini F, Luisetto G, Moro L. Bone organic matrix components: their roles in skeletal physiology. J Endocrinol Invest 2010 Nov; 33(7): 13-5.
2. Zhou HY, Takita H, Fujisawa R, Mizuno M, Kuboki Y. Stimulation by bone sialoprotein of calcification in osteoblast-like MC3T3-E1 cells. Calcif Tissue Int 1995 May; 56(5): 403-7.
3. Mac Neil RL, Berry J, Strayhorn C, Somerman MJ. Expression of bone sialoprotein mRNA by cells lining the mouse tooth root during cementogenesis. Arch Oral Biol 1996 Aug-Sep; 41(8-9): 827-35.

4. Tost J. DNA Methylation: an introduction to the biology and the disease-associated changes of a promising biomarker. *Methods Mol Biol* 2009 Nov; 507(1): 3-20.
5. Tarfiee GA, Noruzinia M, Soleimani M, Kaviani S, Mahmoodinia Maymand M, Farshdousti Hagh M , et al. ROR2 promoter methylation change in osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells. *CJY* 2011; 13(1): 11-8[Article in Persian].
6. Devogelaer JP, Brown JP, Burckhardt P, Meunier PJ, Goemaere S, Lippuner K, et al. Zoledronic acid efficacy and safety over five years in postmenopausal osteoporosis. *Osteoporos Int* 2007 Sep; 18(9): 1211-8.
7. Black DM, Delmas PD, Eastell R ,Reid IR, Boonen S, Cauley JA, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. *N Engl J Med* 2007 May 3; 356(18): 1809-22.
8. Green JR. Bisphosphonates: preclinical review. *Oncologist* 2004 Oct; 9(4): 3-13.
9. Chen J, Shapiro HS, Sodek J. Development expression of bone sialoprotein mRNA in rat mineralized connective tissues. *J Bone Miner Res* 1992 Aug; 7(8): 987-97.
10. Chaplet M, Detry C, Deroanne C, Fisher LW, Castronovo V, Bellahcene A. Zoledronic acid up-regulates bone sialoprotein expression in osteoblastic cells through Rho GTPase inhibition. *Biochem J* 2004 Dec 15; 384(3): 591-8.
11. Stork S, Stork C, Angerer P, Kothny W, Schmitt P, Wehr U, et al. Bone sialoprotein is a specific biochemical marker of bone metabolism in postmenopausal women: a randomized 1-year study. *Osteoporos Int* 2000 Jan; 11(9): 790-6.
12. Freshney RI, Stacey GN, Auerbach JM. Culture of human stem cells. 6<sup>th</sup> ed. USA: John Wiley & Sons; 2007: 207-33.
13. Kazemnejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Amirizadeh N, et al. Biochemical and molecular characterization of hepatocyte-like cells derived from human bone marrow mesenchymal stem cells on a novel three-dimensional biocompatible nanofibrous scaffold. *J Gastroenterol Hepatol* 2009 Feb; 24(2): 278-87[Article in Persian].
14. Ebert R, Zeck S, Krug R, Meissner-Weigl J, Schneider D, Seefried L, et al. Pulse treatment with zoledronic acid causes sustained commitment of bone marrow derived mesenchymal stem cells for osteogenic differentiation. *Bone* 2009 May; 44(5): 858-64.
15. Anonymous. Material Safety Data Sheet. Available at: [http://www.neb.com/nebecomm /products /product\\_M0226.asp](http://www.neb.com/nebecomm/products/product_M0226.asp). Jun, 2003.
16. Anonymous. MethPrimer - Design Primers for Methylation PCRs. Available at: <http://www.urogene.org/methprimer/index1.html>. Nov, 2002.
17. Cheung CL, Xiao SM, Kung AW. Genetic epidemiology of age-related osteoporosis and its clinical applications. *Nat Rev Rheumatol* 2010 Sep; 6(9): 507-17.
18. Vyskocil V. Current options for the treatment of osteoporosis. *Vnitr Lek* 2010 Jul; 56(7): 749-58.
19. Leszczynski P. Zoledronic acid reduces risk of any new clinical fracture and risk of death after surgical repair of a low-trauma hip fracture. *Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol* 2010 May-Jun; 75(3): 168-71.
20. Evans CE, Braidman IP. Effects of two novel bisphosphonates on bone cells in vitro. *Bone Miner* 1994 Aug; 26(2): 95-107.

21. Aparicio A, Gardner A, Tu Y, Savage A, Berenson J, Lichtenstein A. In vitro cytoreductive effects on multiple myeloma cells induced by bisphosphonates. *Leukemia* 1998 Feb; 12(2): 220-9.
22. Senaratne SG, Pirianov G, Mansi JL, Arnett TR, Colston KW. Bisphosphonates induce apoptosis in human breast cancer cell lines. *Br J Cancer* 2000 Apr; 82(8): 1459-68.
23. Fromigue O, Lagneaux L, Body JJ. Bisphosphonates induce breast cancer cell death in vitro. *J Bone Miner Res* 2000 Nov; 15(11): 2211-21.
24. Boissier S, Ferreras M, Peyruchaud O, Magnetto S, Ebetino FH, Colombel M, et al. Bisphosphonates inhibit breast and prostate carcinoma cell invasion, an early event in the formation of bone metastases. *Cancer Res* 2000 Jun 1; 60(11): 2949-54.
25. Malaval L, Liu F, Roche P, Aubin JE. Kinetics of osteoprogenitor proliferation and osteoblast differentiation in vitro. *J Cell Biochem* 1999 Sep 15; 74(4): 616-27.
26. Young MF, Kerr JM, Ibaraki K, Heegaard AM, Robey PG. Structure, expression, and regulation of the major noncollagenous matrix proteins of bone. *Clin Orthop Relat Res* 1992 Aug; 1(281): 275-94.
27. Kerr JM, Fisher LW, Termine JD, Wang MG, McBride OW, Young MF. The human bone sialoprotein gene (IBSP): genomic localization and characterization. *Genomics* 1993 Aug; 17(2): 408-15.
28. Mac Dougall M. Refined mapping of the human dentin sialophosphoprotein (DSPP) gene within the critical dentinogenesis imperfecta type II and dentin dysplasia type II loci. *Eur J Oral Sci* 1998 Jan; 106(1): 227-33.
29. Arai N, Ohya K, Kasugai S, Shimokawa H, Ohida S, Ogura H, et al. Expression of bone sialoprotein mRNA during bone formation and resorption induced by colchicine in rat tibial bone marrow cavity. *J Bone Miner Res* 1995 Aug; 10(8): 1209-17.
30. Finta C, Kiss A. Footprint analysis of the bsp RI DNA methyltransferase-DNA interaction. *Nucleic Acids Res* 1997 Jul 15; 25(14): 2841-6.

# The effect of zoledronic acid on BSP expression and methylation during osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells

**Farsh Dusty Hagh M<sup>1</sup>(MSc.) – Nowrozi Niya M<sup>2</sup>(PHD) – Mortazavi Y<sup>3</sup>(PHD) –  
Soleimani M<sup>4</sup>(PHD) – Kaviyany S<sup>4</sup>(PHD) – Mahmoodi Niya Meymand M<sup>5</sup>(MSc.)**

1 Master of Sciences in Hematology & Blood Bank, Hematology Department, School of Medical Sciences, Tarbiyat Modaress University, Tehran, Iran  
2 Assistant Professor, Medical Genetics Department, School of Medical Sciences, Tarbiyat Modaress University, Tehran, Iran  
3 Associate Professor, Hematology Department, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran  
4 Assistant Professor, Hematology Department, School of Medical Sciences, Tarbiyat Modaress University, Tehran, Iran  
5 Master of Sciences in Molecular Cellular Biology, Molecular & Cellular and Stem Cell Transplantation Research Center, Sarem Hospital, Tehran, Iran

## Abstract

Received : Jan 2011  
Accepted : May 2011

**Background and Aim:** Bone sialoprotein (BSP) is a specific marker of osteoblastic differentiation. In this research, the effect of Zoledronic Acid on BSP expression and methylation status during osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) was evaluated.

**Materials and Methods:** In this experimental study, MSCs were isolated from human bone marrow. For osteogenic differentiation, hMSCs were pulse treated with zoledronic acid, and were incubated in osteogenic differentiation medium for 3 weeks. The DNA and RNA were extracted after the first, second and third weeks of culture and also from undifferentiated MSCs. After Sodium bisulfate (SBS) treatment, gene specific methylation analysis for BSP was carried out using Methylation Specific PCR technique.

**Results:** BSP expression was observed in osteoblastic differentiated cells whereas it was not seen in MSCs. MSP showed that BSP was unmethylated during osteoblastic differentiation.

**Conclusion:** BSP was expressed from the first week of differentiation. This confirms that zoledronic acid accelerates osteoblastic differentiation. Unmethylation status of BSP indicates that zoledronic acid does not have any effect on BSP methylation status. Other genetic or epigenetic mechanisms may control BSP expression during osteoblastic differentiation induction by zoledronic acid.

**Key words:** Mesenchymal Stem Cell, Zoledronic Acid, Osteoblast Differentiation, BSP, DNA Methylation

\* Corresponding author:  
Mortazavi Y;  
E-mail :  
Youmort@yahoo.com