

## ارتباط پلی‌مورفیسم‌های اگزون ده ژن گیرنده FSH و نتیجه‌ی IVF در زنان ایرانی

ملیحه جوادی‌ارجمند<sup>۱</sup>، علیا دماوندی<sup>۲</sup>، حمید چوبینه<sup>۳</sup>، مجید کابلی<sup>۴</sup>، محسن قدمی<sup>۵\*</sup>

### چکیده

**زمینه و هدف:** هورمون گلیکوپروتئینی محرک فولیکول یا همان FSH وظایف خود را از طریق گیرنده‌اش (FSHR) اعمال می‌کند. این هورمون در زنانی که در سن باروری قرار دارند، موجب رشد و تکامل فولیکول‌ها در تخمدان در مرحله فولیکولی چرخه قاعدگی می‌شود. این هورمون به‌طور گسترده در درمان ناباروری استفاده قرار می‌گیرد. پلی‌مورفیسم‌های متعددی تاکنون در ژن FSHR گزارش شده است که در پاسخ تخمدانی تأثیرگذار هستند ولیکن ژن FSHR دارای دو پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی بسیار رایج در موقعیت‌های ۶۸۰ و ۳۰۷ در اگزون شماره ۱۰ می‌باشد. یکی از آن‌ها در جایگاه ۳۰۷ موجب تغییر آمینواسید ترئونین به آلانین شده و دیگری در جایگاه ۶۸۰ موجب تغییر اسپارژین به سرین می‌شود. مطالعات انجام شده نشان داده است که این دو پلی‌مورفیسم با پاسخ‌های متفاوت تخمدان و نتایج مختلف IVF در جمعیت‌های مختلف مرتبط است. بیشتر مطالعات تاکنون به‌طور ویژه بر روی rs6166 (p.Asn680Ser) انجام شده است، اما این مطالعه به بررسی ارتباط احتمالی بین rs6166 و rs6165 (p.Thr307Ala) و نتیجه‌ی IVF می‌پردازد.

**روش بررسی:** پلی‌مورفیسم‌های موجود در اگزون ۱۰ ژن FSHR پس از خون‌گیری و استخراج DNA با استفاده از روش PCR-RFLP در ۱۲۰ زن در دو گروه مساوی شامل زنان نابارور با IVF موفق و زنان نابارور با IVF ناموفق بررسی گردید. به‌منظور تأیید نتایج، تعیین توالی DNA برای برخی از نمونه‌های انتخاب شده انجام گرفت. در نهایت نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل گردید.

**یافته‌ها:** در هر دو SNP مورد بررسی تفاوت معنی‌داری در فراوانی آللی بین گروه IVF موفق و گروه IVF ناموفق، با در نظر گرفتن ویژگی‌های کلینیکی و پاراکلینیکی از جمله سن، وزن، مدت ازدواج و ... مشاهده نشد ( $P\text{-value} > 0.05$ ). نتیجه‌گیری: باوجود نتایج متفاوت مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر پلی‌مورفیسم‌های (rs6166 و rs6165) ژن FSHR در جمعیت‌های مختلف، با توجه به عدم تفاوت معنی‌دار در فراوانی پلی‌مورفیسم‌های فوق در جمعیت مورد مطالعه، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که از این دو پلی‌مورفیسم برای پیش‌بینی نتیجه‌ی IVF در زنان نابارور ایرانی، نمی‌توان استفاده کرد. **واژه‌های کلیدی:** ژن FSHR، پلی‌مورفیسم، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، ناباروری

دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۲/۲۶

\* نویسنده مسئول:

محسن قدمی؛

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email:

mghadami@tums.ac.ir

۱ کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۲ استادیار گروه فتوداینامیک، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی، پژوهشکده بار، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۳ دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۴ استادیار گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۵ دانشیار گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

## مقدمه

متعدد استفاده می‌شود. با این حال، پاسخ تخمدان به FSH اگزوزن در بین زنانی که تحت IVF قرار می‌گیرند، متفاوت است و بر اساس تعداد تخمک‌ها به سه دسته‌ی ضعیف (غیربهبه‌ی)، طبیعی یا بیش پاسخ‌دهنده طبقه‌بندی می‌شوند. واضح است که عوامل زیادی مانند سن، میانگین طول سیکل قاعدگی، تعداد فولیکول‌های آنترال (AFC)، سطح پایه برخی از هورمون‌ها از جمله LH، FSH، E2، inhibin B و AMH همگی در تفاوت‌های پاسخ تخمدان مهم هستند (۱۸-۱۴).

## روش بررسی

## • انتخاب بیمار

این مطالعه مورد-شاهدی بر روی بیماران زن مراجعه‌کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان دکتر شریعتی تهران، انجام شد. انتخاب نمونه به صورت تصادفی بوده است. رضایت‌نامه از تمامی شرکت‌کنندگان گرفته شده است. در مجموع ۱۲۰ زن نابارور در این مطالعه مشارکت کردند که در نیمی از آن‌ها IVF موفقیت‌آمیز و در نیمی دیگر ناموفق بود. شرح حال دقیق پزشکی از تمامی بیماران جمع‌آوری شد. معیارهای IVF موفق شامل بارداری بالینی تأیید شده توسط آزمایش خون، وجود کیسه حاملگی و فعالیت قلب جنینی پس از درمان با IVF بود. در بیمارانی که IVF ناموفق داشتند، بارداری بالینی پس از انجام دو دوره IVF تأیید نشد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن سیکل قاعدگی منظم ۲۱-۳۵ روزه، سن زیر ۴۰ سال و عدم مصرف دخانیات. ناباروری ناشی از عوامل مردانه مانند آواسپرمی و واریکوسل از مطالعه خارج شد. علاوه بر این، زنان نابارور مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یا اندومتر یوز از مطالعه حذف شدند. مشخصات بالینی و پاراکلینیکی بیماران در جدول ۱، ارائه شده است. به دنبال حساسیت‌زدایی کامل (پروتکل طولانی‌مدت) با استفاده از بوسرلین، آگونیست هورمون آزادکننده‌ی گنادوتروپین (Daroo Sazi Samen Co, Iran)، Gonadotropin Releasing Hormone (Serono)، سوئیس) برای تحریک تخمدان در روز سوم سیکل بعدی تجویز شد.

## جدول ۱: ویژگی‌های بالینی و پاراکلینیکی گروه‌های موفق و ناموفق IVF

متغیرها	IVF موفق	IVF ناموفق
سن (سال)	۲۷/۲۳ ± ۴/۳۲	۳۲/۱۲ ± ۴/۵۱
BMI (kg/m <sup>2</sup> )	۲۵/۲ ± ۴	۲۴/۹ ± ۴/۱
مدت ازدواج (سال)	۷/۲ ± ۳/۲	۷/۵ ± ۴/۱
مدت ناباروری (سال)	۵/۲ ± ۳/۲	۵/۵ ± ۴/۱
میزان هورمون LH (mIU/ml)	۶/۵۲ ± ۲/۱۳	۷/۵۲ ± ۱/۹۸

هورمون محرک فولیکول (FSH) و هورمون لوتهینه‌کننده (LH) دو گلیکو پروتئینی هستند که از سلول‌هایی به نام گنادوتروف در هیپوفیز قدامی ترشح می‌شوند و برای عملکرد طبیعی غدد جنسی ضروری هستند (۱). در زنان، FSH در رشد فولیکول، بلوغ تخمک، تنظیم استروئیدوزن و تکثیر سلول‌های گرانولوز نقش دارد و باعث سنتز آنزیم تبدیل‌کننده‌ی آندروژن (آروماتاز) می‌شود (۲). هورمون FSH با گیرنده‌ی سطح سلولی خود، FSHR، که در موقعیت کروموزومی 2p21-p16 قرار دارد، تعامل دارد (۳-۶). ژن FSHR ۱۹۲ کیلو باز و حاوی ۱۰ اگزوزن است (۷). ناحیه N ترمینال دومین خارج سلولی (ECD) گیرنده توسط نه اگزوزن اول ژن کدگذاری می‌شود، اما ناحیه C ترمینال ECD، دومین گذرنده از غشا (TMD) و دومین درون سلولی (ICD) گیرنده توسط اگزوزن شماره ۱۰ ژن که بزرگ‌ترین اگزوزن است کدگذاری می‌شود. جهش‌های فعال‌کننده، جهش‌های غیرفعال‌کننده و SNP‌های مختلف در نواحی کدکننده و اینترونیک ژن FSHR در جمعیت‌های مختلف شناسایی شده است (۸). بیش از ۹۰۰ SNP در پایگاه داده HapMap برای ژن FSHR گزارش شده است (۹). از هشت SNP موجود در مناطق کدکننده ژن FSHR، یکی در 5' UTR mRNA FSHR در موقعیت ۲۹- است (c-29G/A, rs1394205) و هفت SNP دیگر در اگزوزن شماره ۱۰ ژن در موقعیت کدون‌های ۳۰۷، ۳۲۹، ۴۴۹، ۵۲۴، ۵۶۷، ۶۶۵ و ۶۸۰ است. دو مورد از SNP‌هایی که مطالعات فراوانی روی آن‌ها انجام شده است و در اگزوزن شماره ۱۰ ژن قرار دارند عبارتند از: c. 919A/G, p. Thr307Ala, rs165 (که در ناحیه به اصطلاح لولا (hinge) ECD قرار دارد) و c. 2039A/G, p. Asn680Ser, rs166 (که در ناحیه ICD گیرنده قرار دارد). مطالعات انجام شده حاکی از این است که این دو SNP با هم در عدم تعادل پیوستگی هستند (۱۳-۱۰ و ۶). روش IVF رایج‌ترین و مؤثرترین نوع ART (تکنولوژی کمک باروری) است. چنین روش‌هایی نیاز به تحریک تخمدان‌ها به صورت کنترل شده (COS) دارند. برای این منظور، تجویز FSH اگزوزن به‌طور گسترده‌ای به‌منظور افزایش بلوغ فولیکول‌ها و تخمک‌های

۴/۶۳± ۱/۷۳	۵/۳۱± ۳/۰۴	میزان هورمون FSH(mIU/ml)
۷/۸± ۲/۹	۱۰/۳± ۲/۷۵	تعداد فولیکول آنترال
۱۲/۸± ۱/۷۵	۱۲/۷± ۲/۱	تعداد روزهای تحریک تخمدان
۲/۷± ۰/۵۸	۲/۵± ۰/۸	تعداد جنین انتقال یافته

\* داده‌ها به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده‌اند.

\*\* هورمون محرک فولیکول (FSH)، هورمون لوتهینه‌کننده (LH) و استرادیول در روز سوم از سیکل اندازه‌گیری شد.

### • جداسازی DNA

از هر شرکت‌کننده ۵ میلی‌لیتر خون در لوله‌های حاوی EDTA جمع‌آوری شد. DNA ژنومی از لکوسیت‌های خون محیطی با استفاده از کیت (QIAamp DNA Mini Kit(QIAGEN) و روش فنل - کلروفرم استخراج شد.

واریانت‌های Thr307Ala و Asn680Ser با استفاده از روش PCR-RFLP همان‌گونه که توسط Sudo و همکاران توضیح داده شد، شناسایی شدند (۱۹).

### • تجزیه و تحلیل واریانت Asn680Ser

برای ناحیه نوکلئوتیدی ۱۶۲۴ تا ۲۱۴۳ در ژن FSHR، DNA ژنومی و مجموعه‌ای از پرایمرهای (F: 3'-TTTGTGGTCATCTGTGGCTGC-3' و R: 5'-CAAAGGCAAGGACTGAATTATCATT-3') برای تکثیر قطعه DNA به اندازه ۵۲۰ جفت باز استفاده شد. DNA ژنومی در حجم ۲۵ میکرولیتر، حاوی ۱ میکرولیتر DNA ژنومی (۲۰۰-۱۰۰ نانوگرم)، ۱ میکرولیتر پرایمرهای فوروارد و معکوس با غلظت ۱۰ (pmol/μl)، ۲ میکرولیتر DMSO ۲۰ درصد، ۱۲ میکرولیتر Master Mix و ۸ میکرولیتر ddH<sub>2</sub>O تکثیر شد. پس از دناتوراسیون اولیه در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه، PCR شامل ۳۰ چرخه دناتوراسیون در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، annealing در دمای ۶۳ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ ثانیه، گسترش در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه و مرحله نهایی گسترش در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷ دقیقه انجام شد. به منظور تأیید تکثیر قطعه مورد نظر محصولات PCR بر روی ژل آگارز ۱ درصد بارگذاری شدند. سپس قطعات تکثیرشده با اندونوکلاز محدودکننده BsrI در دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد در طول شب هضم گردیدند و روی ژل آگارز ۲/۵٪ الکتروفورز شدند. سه الگوی مختلف روی ژل مشاهده شد. نهایتاً برخی از نمونه‌ها برای تأیید نتایج توالی‌یابی شدند.

### • تجزیه و تحلیل واریانت Thr307Ala

روش nested PCR-RFLP برای تشخیص این نوع واریانت انجام شد. ناحیه


نوکلئوتیدی ۹۳۱ تا ۱۵۷۸ ابتدا توسط DNA ژنومی به عنوان الگو و مجموعه‌ای از پرایمرهای زیر تکثیر شد: پرایمر 5'-TCTGAGCTTCATCCAATTTGCA-3' و پرایمر 5'-GGGAAAGAGGGCAGCTGCAA-3' شرایط انجام PCR بدین صورت بود: دناتوراسیون اولیه در ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه و سپس ۱۰ چرخه دناتوراسیون در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه، annealing در ۶۲ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه، گسترش در ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه و گسترش نهایی در ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷ دقیقه. در دور اول PCR، قطعات DNA به اندازه ۶۵۷ جفت باز تکثیر شد. دور دوم PCR با استفاده از مجموعه جدیدی از پرایمرها به شرح زیر انجام شد: پرایمر 5'-CAAATCTATTTAAGGCAAGAAGTTGATTATATGCCTCAG-3' و پرایمر 5'-GTAGATTCCAATGCAGAGATCA-3' در این چرخه، پس از دناتوراسیون اولیه در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه، ۲۵ چرخه دناتوراسیون در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، annealing در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه، گسترش در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ ثانیه و مرحله نهایی گسترش در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۷ دقیقه انجام شد. پروتکل‌های انجام PCR برای این واریانت طبق پروتکل Singhasena و همکاران انجام شد (۲۰). پس از هضم محصولات نهایی PCR با استفاده از آنزیم محدودکننده Bsu36I در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در طول شب، محصولات روی ژل آگارز ۲/۵ درصد بارگذاری و مشاهده شدند. به منظور تأیید نتایج به دست آمده توسط RFLP برخی از نمونه‌ها برای توالی‌یابی DNA ارسال شدند.

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری (IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0, Armonk, NY: IBM Corp.) تجزیه و تحلیل شد. عدد P کمتر از ۰/۰۵ برای همه آزمون‌ها معنی‌دار در نظر گرفته شد. برای ارزیابی معنی‌داری تفاوت‌ها بین گروه‌ها از آزمون Chi-square (کای دو) استفاده شد.

## یافته‌ها


توزیع فراوانی آللی و ژنوتیپی بین بیماران IVF موفق و IVF ناموفق برای هر SNP در جدول ۲، نشان داده شده است. با توجه به مقدار عدد P برای rs6165 که مقدار ۰/۷۸ است و برای rs6166 این عدد برابر ۱ است، تفاوت معنی‌داری بین افراد با IVF موفق و IVF ناموفق در فرکانس‌های آللی مشاهده نشد. مقایسه‌ی فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی مورد انتظار با فراوانی‌های مشاهده شده نشان داد که جمعیت مورد مطالعه برای هر دو SNP در تعادل هاردی واینبرگ قرار دارد (عدد P کوچک‌تر از ۰/۰۵).

شناسایی دو SNP در اگزون ۱۰ ژن FSHR پس از تکثیر DNA ژنومی استخراج شده توسط PCR انجام شد. آمپلیکون‌ها (قطعات تکثیر) برای هر دو SNP با آنزیم‌های محدودکننده خاص هضم شدند و بر روی ژل آگارز ۲/۵ درصد همان‌گونه که در شکل ۱ (Asn680Ser) و شکل ۲ (Thr307Ala) نشان داده شده است، الکتروفورز شدند. تعیین توالی DNA برای برخی از نمونه‌های انتخاب شده به منظور تأیید نتایج انجام شد. نتایج توالی‌یابی نیز یافته‌ها را تأیید کرد.



شکل ۱: نتایج RFLP واریانت Asn680Ser ژن FSHR

ستون ۱: باندهای ۴۱۳ جفت‌باز برای SS، ستون‌های ۲، ۴، ۶ و ۷: باندهای ۵۲۰ جفت‌باز برای NN، ستون‌های ۳ و ۵: دو باندهای ۵۲۰ و ۴۱۳ جفت‌باز برای NS. ستون ۸: نردبان DNA (Ladder) ۱۰۰ جفت‌بازی



شکل ۲: نتایج RFLP واریانت Thr307Ala ژن FSHR

ستون‌های ۱ و ۳: باندهای ۳۶۴ جفت‌باز برای TT، ستون ۲: باندهای ۳۲۸ جفت‌باز برای AA، ستون ۴: دو باندهای ۳۶۴ و ۳۲۸ جفت‌باز برای TA، ستون ۵: نردبان DNA ۱۰۰ جفت‌بازی

جدول ۲: فراوانی آللی و توزیع ژنوتیپی SNPهای rs6165 و rs6166 در گروه‌های موفق و ناموفق IVF

OR (%CI 95)	P-value	IVF موفق ۶۰ نفر	IVF ناموفق ۶۰ نفر	آللی‌ها / ژنوتیپ‌ها	SNP
.	۱	۳۶ (۳۰ درصد)	۳۶ (۳۰ درصد)	A	<b>Rs6166</b>
.	.	۸۴ (۷۰ درصد)	۸۴ (۷۰ درصد)	G	
۰/۰۳ (۰/۰۰۱ - ۰/۵۵۵)	۰/۰۲	۱۲ (۲۰ درصد)	۰ (۰ درصد)	AA	
۶ (۲/۶۵ - ۱۳/۵۷)	<۰/۰۰۰۱	۱۲ (۲۰ درصد)	۳۶ (۶۰ درصد)	AG	
۰/۴ (۰/۲۱ - ۰/۹۲)	۰/۰۳	۳۶ (۶۰ درصد)	۲۴ (۴۰ درصد)	GG	
۰/۹۲ (۰/۵۳ - ۱/۵۹)	۰/۷۸	۳۸ (۳۲ درصد)	۳۶ (۳۰ درصد)	A	<b>Rs6165</b>
۱/۰۸ (۰/۶۲ - ۱/۸۷)	.	۸۲ (۶۸ درصد)	۸۴ (۷۰ درصد)	G	
۰/۰۳ (۰/۶۲ - ۰/۵۵۵)	۰/۰۲	۱۲ (۲۰ درصد)	۰ (۰ درصد)	AA	
۴/۹۳ (۲/۲۳ - ۱۰/۸۶)	۰/۰۰۰۱	۱۴ (۲۳ درصد)	۳۶ (۶۰ درصد)	AG	
۰/۵ (۰/۲۴۶ - ۱/۰۵۴)	۰/۰۷	۳۴ (۵۷ درصد)	۲۴ (۴۰ درصد)	GG	

## بحث

نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری در rs6166 و rs6165 در آگرون ۱۰ ژن FSHR بین گروه‌های موفق و ناموفق IVF وجود ندارد. همان‌طور که در ابتدای مطالعه بیان شد، معیار IVF موفق برای بیماران مشاهده حاملگی بالینی بود. در جمعیت مورد مطالعه، نتیجه‌ی انجام IVF چه موفق و چه ناموفق تحت تأثیر این دو واریانت قرار نگرفت.

در سال‌های اخیر، مطالعات زیادی اهمیت و تأثیر ژنوتیپ FSHR، به‌ویژه پلی‌مورفیسم rs6166 در آگرون ۱۰ را بر پاسخ تخمدان و نتیجه IVF ارزیابی کرده‌اند، اما نتایج متناقض هستند. دو واریانت موجود در آگرون ۱۰ ژن FSHR، یعنی rs6166 و rs6165، برای تغییر اثر تحریک کنترل‌شده‌ی تخمدان در زنان با عملکرد طبیعی تخمدان پیشنهاد شده است (۱۳). بین این دو پلی‌مورفیسم، rs6166 به‌طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است (۲۱). نقش و اهمیت Asn680Ser (rs6166) در رابطه با تحریک کنترل‌شده‌ی تخمدان ابتدا توسط Mayorga و همکاران بررسی شد (۱۴). نتایج مطالعه‌ی Perez و همکاران نشان داد که زنان هموزیگوت برای واریانت سرین، به غلظت‌های بالاتری از سطوح پایه هورمون FSH و گنادوتروپین افزایش یافته برای تحریک کنترل‌شده‌ی تخمدان (COS) نیاز داشتند ولیکن در نتایج بالینی تفاوتی مشاهده نشد. برخی مطالعات دیگر، رابطه‌ی بین FSH پایه، ژنوتیپ FSHR و پاسخ تخمدان را نشان داده‌اند (۲۴-۲۲-۱۹). با این حال، در برخی از مطالعات هیچ ارتباطی بین واریانت Asn680Ser ژن FSHR و پاسخ تخمدان پیدا نشده است (۲۹-۲۵). همان‌طور

که در مطالعه‌ی Theron-Gerard و همکاران و Dieamant و همکاران نشان داده شده است، ژنوتیپ FSHR همچنین ممکن است بر حساسیت به FSH آگروژن تأثیر بگذارد. دوزهای بالاتر FSH نوترکیب برای زنان هموزیگوت برای واریانت سرین در موقعیت ۶۸۰ و واریانت آلانین در موقعیت ۳۰۷ مورد نیاز است (۳۱ و ۳۰). نتایج هر دوی این مطالعات نشان می‌دهد که این دو پلی‌مورفیسم با پاسخ تخمدان مرتبط هستند اما به ذخیره‌ی تخمدان مربوط نمی‌شوند. در یک متا آنالیز بزرگ که توسط Yao و همکاران انجام شد، تفاوت آماری معنی‌داری در تعداد تخمک یا میزان بارداری بین ژنوتیپ‌های مختلف Asn680Ser مشاهده نشد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد (۳۲). علاوه بر بررسی ژنوتیپ‌های مختلف Asn680Ser، در مطالعه‌ی حاضر ژنوتیپ‌های مختلف واریانت Ala307Thr نیز بررسی شدند و ارتباط احتمالی آن‌ها با نتیجه‌ی IVF همراه با واریانت Asn680Ser بررسی گردید. در مطالعه‌ی دیگری که توسط König و همکاران انجام شد، تفاوت معنی‌داری در میزان تولد زنده پس از درمان بیماران با IVF و ژنوتیپ‌های مختلف واریانت Asn680Ser یافت نشد (۳۳). در مطالعه‌ی Klinkert و همکاران رابطه‌ی بین SNPهای ژن FSHR و تحریک تخمدان با گنادوتروپین‌ها بررسی شد. نتایج بدین صورت بود که در زنان هموزیگوت برای سرین در موقعیت ۶۸۰، میزان لانه‌گزینی و بارداری در مقایسه با بیماران که برای اسپارازین در همین موقعیت هموزیگوت بودند، سه برابر بیشتر بود. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که ژنوتیپ ژن FSHR با پاسخ ضعیف در IVF مرتبط نیست، که این یافته بر خلاف سایر



مطالعات بود (۲۷). در مطالعه‌ی Ganesh و همکاران فراوانی آللی آلل A برای پلی مورفیسم rs6166 و آلل G برای پلی مورفیسم rs6165 در زنانی که IVF موفق داشتند، در مقایسه با بیمارانی که IVF ناموفق داشتند، به‌طور قابل توجهی بالاتر بود. البته در این مطالعه، خاطر نشان شد که ترکیبی از پلی مورفیسم‌های چندین ژن کاندید نظیر استروژن و پروژسترون همراه با ژن گیرنده‌ی هورمون FSH (FSHR) برای ارزیابی نتایج IVF مورد نیاز است (۳۴). همان‌طور که اشاره شد، نتایج مطالعات گوناگون متناقض هستند و بین مطالعات مختلف که رابطه‌ی بین ژنوتیپ‌های ژن FSHR، پاسخ تخمدان و نتیجه‌ی IVF را بررسی کرده‌اند، سازگاری وجود ندارد. این تفاوت‌ها می‌تواند به‌دلیل عوامل متعددی مانند حجم نمونه، طراحی مطالعه، پروتکل تحریکی مورد استفاده برای تخمدان و نژادهای مختلف نمونه‌ها باشد. علاوه بر عوامل بالینی و بیوشیمیایی، دو مطالعه به بررسی عامل فارماکوژنتیک (۳۶ و ۳۵) برای پیش‌بینی پاسخ تخمدان پرداخته و دریافته‌اند که هم عوامل ژنتیکی هم عوامل محیطی بر تحریک تخمدان‌ها تأثیرگذار هستند (۳۷).

## نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم‌های ژن FSHR در موقعیت ۳۰۷ و

۶۸۰ با نتیجه‌ی IVF در زنان ایرانی ارتباطی ندارد. هیچ تفاوتی در میزان حاملگی بالینی (نتیجه موفقیت‌آمیز IVF) بین گروه‌ها مشاهده نشد. از آنجایی که یافته‌های بحث برانگیز در جمعیت‌های مختلف در رابطه با تأثیر پلی مورفیسم‌های ژن FSHR بر پاسخ تخمدان و نتیجه‌ی IVF وجود دارد، انجام چنین مطالعاتی در جمعیت‌های مختلف ضروری است. یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر حجم نمونه‌ی آن بود. بنابراین، مطالعات بیشتری با حجم نمونه‌ی بزرگ‌تر در جمعیت ایرانی مورد نیاز است تا مشخص شود که آیا می‌توان از این دو پلی مورفیسم ژنتیکی در چرخه‌های قبل از انجام IVF برای پیش‌بینی موفقیت IVF و بارداری بالینی استفاده کرد یا خیر؟ به‌منظور افزایش حساسیت و اختصاصیت، لازم است مطالعات ترکیبی دیگری به بررسی پلی مورفیسم‌های سایر ژن‌های کاندید مانند استروژن، پروژسترون و LHR صورت پذیرد.

## تشکر و قدردانی

مقاله‌ی حاضر برگرفته از پایان‌نامه به کد اخلاق IR.TUMS.REC.1394.1717 است که در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب رسیده است. از همه‌ی نویسندگان که در انجام این پژوهش یاری داده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

## References

- Desai SS, Roy BS & Mahale SD. Mutations and polymorphisms in FSH receptor: Functional implications in human reproduction. *Reproduction* 2013; 146(6): R235-R48.
- Laven JSE, Mulders AGMG, Suryandari DA, Gromoll J, Nieschlag E, Fauser BCJM, et al. Follicle-stimulating hormone receptor polymorphisms in women with normogonadotropic anovulatory infertility. *Fertility and Sterility* 2003; 80(4): 986-92.
- Rousseau-Merck MF, Atger M, Loosfelt H, Milgrom E & Berger R. The chromosomal localization of the human follicle-stimulating hormone receptor gene (FSHR) on 2p21-p16 is similar to that of the luteinizing hormone receptor gene. *Genomics* 1993; 15(1): 222-4.
- Simoni M, Gromoll J & Nieschlag E. The follicle-stimulating hormone receptor: Biochemistry, molecular biology, physiology, and pathophysiology. *Endocrine Reviews* 1997; 18(6): 739-73.
- Themmen APN & Huhtaniemi IT. Mutations of gonadotropins and gonadotropin receptors: Elucidating the physiology and pathophysiology of pituitary-gonadal function. *Endocrine Reviews* 2000; 21(5): 551-83.
- Simoni M, Nieschlag E & Gromoll J. Isoforms and single nucleotide polymorphisms of the FSH receptor gene: Implications for human reproduction. *Human Reproduction Update* 2002; 8(5): 413-21.
- Gromoll J, Dankbar B & Gudermann T. Characterization of the 5' flanking region of the human follicle-stimulating hormone receptor gene. *Molecular and Cellular Endocrinology* 1994; 102(1-2): 93-102.

8. Lussiana C, Guani B, Mari C, Restagno G, Massobrio M & Revelli A. Mutations and polymorphisms of the FSH receptor (FSHR) gene: Clinical implications in female fecundity and molecular biology of FSHR protein and gene. *Obstetrical and Gynecological Survey* 2008; 63(12): 785-95.
9. Cannarella R, Musso N, Condorelli RA, Musmeci M, Stefani S, Aversa A, et al. The 2039 A/G FSH receptor gene polymorphism influences glucose metabolism in healthy men. *Endocrine* 2020; 70(3): 629-34.
10. Aittomaki K, Lucena JL, Pakarinen P, Sistonen P, Tapanainen J, Gromoll J, et al. Mutation in the follicle-stimulating hormone receptor gene causes hereditary hypergonadotropic ovarian failure. *Cell* 1995; 82(6): 959-68.
11. Simoni M, Gromoll J, Hoppner W, Kamischke A, Krafft T, Stahle D, et al. Mutational analysis of the follicle-stimulating hormone (FSH) receptor in normal and infertile men: Identification and characterization of two discrete FSH receptor isoforms1. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 1999; 84(2): 751-5.
12. Gromoll J & Simoni M. Follicle-stimulating-hormone receptor and twinning. *The Lancet* 2001; 357(9251): 231-2.
13. Gromoll J & Simoni M. Genetic complexity of FSH receptor function. *Trends in Endocrinology and Metabolism* 2005; 16(8): 368-73.
14. Mayorga MP, Gromoll J, Behre HM, Gassner C, Nieschlag E & Simoni M. Ovarian response to follicle-stimulating hormone (FSH) stimulation depends on the FSH receptor genotype. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 2000; 85(9): 3365-9.
15. Van-Santbrink EJ & Fauser BC. Urinary follicle-stimulating hormone for normogonadotropic clomiphene-resistant anovulatory infertility: Prospective, randomized comparison between low dose step-up and step-down dose regimens. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 1997; 82(11): 3597-602.
16. Bennink HJC, Fauser BC & Out HJ. Recombinant follicle-stimulating hormone (FSH; Puregon) is more efficient than urinary FSH (Metrodin) in women with clomiphene citrate-resistant, normogonadotropic, chronic anovulation: A prospective, multicenter, assessor-blind, randomized, clinical trial. *European puregon collaborative anovulation study group. Fertility and Sterility* 1998; 69(1): 19-25.
17. Imani B, Eijkemans MJ, Faessen GH, Bouchard P, Giudice LC & Fauser BCJM. Prediction of the individual follicle-stimulating hormone threshold for gonadotropin induction of ovulation in normogonadotropic anovulatory infertility: An approach to increase safety and efficiency. *Fertility and Sterility* 2002; 77(1): 83-90.
18. Wunsch A, Sonntag B & Simoni M. Polymorphism of the FSH receptor and ovarian response to FSH. *Annales d'Endocrinologie* 2007; 68(2-3): 160-6.
19. Sudo S, Kudo M, Wada SI, Sato O, Hsueh AJW & Fujimoto S. Genetic and functional analyses of polymorphisms in the human FSH receptor gene. *Molecular Human Reproduction* 2002; 8(10): 893-9.
20. Singhasena W, Pantasri T, Piromlertamorn W, Samchinchom S & Vutyavanich T. Follicle-stimulating hormone receptor gene polymorphism in chronic anovulatory women, with or without polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study. *Reproductive Biology and Endocrinology* 2014; 12(86): 1-7.
21. Mohiyiddeen L & Nardo LG. Single-nucleotide polymorphisms in the FSH receptor gene and ovarian performance: Future role in IVF. *Human Fertility (Cambridge, England)* 2010; 13(2): 72-8.
22. De-Castro F, Ruiz R, Montoro L, Perez-Hernandez D, Padilla ESC, Real LM, et al. Role of follicle-stimulating hormone receptor Ser680Asn polymorphism in the efficacy of follicle-stimulating hormone. *Fertility and Sterility* 2003; 80(3): 571-6.
23. De-Koning C, Benjamins T, Harms P, Homburg R, Van-Montfrans JM, Gromoll J, et al. The distribution of FSH receptor isoforms is related to basal FSH levels in subfertile women with normal menstrual cycles. *Human Reproduction* 2006; 21(2): 443-6.



24. Jun JK, Yoon JS, Ku SY, Choi YM, Hwang KR, Park SY, et al. Follicle-stimulating hormone receptor gene polymorphism and ovarian responses to controlled ovarian hyperstimulation for IVF-ET. *Journal of Human Genetics* 2006; 51(8): 665-70.
25. Daelemans C, Smits G, De-Maertelaer V, Costagliola S, Englert Y, Vassart G, et al. Prediction of severity of symptoms in iatrogenic ovarian hyperstimulation syndrome by follicle-stimulating hormone receptor Ser680Asn polymorphism. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 2004; 89(12): 6310-5.
26. Greb RR, Grieshaber K, Gromoll J, Sonntag B, Nieschlag E, Kiesel L, et al. A common single nucleotide polymorphism in exon 10 of the human follicle stimulating hormone receptor is a major determinant of length and hormonal dynamics of the menstrual cycle. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 2005; 90(8): 4866-72.
27. Klinkert ER, Te-Velde ER, Weima S, Van-Zandvoort PM, Hanssen RGJM, Nilsson PR, et al. FSH receptor genotype is associated with pregnancy but not with ovarian response in IVF. *Reproductive Biomedicine Online* 2006; 13(5): 687-95.
28. Mohiyiddeen L, Newman WG, Mc-Burney H, Mulugeta B, Roberts SA & Nardo LG. Follicle-stimulating hormone receptor gene polymorphisms are not associated with ovarian reserve markers. *Fertility and Sterility* 2012; 97(3): 677-81.
29. Mohiyiddeen L, Newman WG, Cerra C, Mc-Burney H, Mulugeta B, Roberts SA, et al. A common Asn680Ser polymorphism in the follicle-stimulating hormone receptor gene is not associated with ovarian response to gonadotropin stimulation in patients undergoing in vitro fertilization. *Fertility and Sterility* 2013; 99(1): 149-55.
30. Theron-Gerard L, Pasquier M, Czernichow C, Cedrin-Durnerin I & Hugues J. Follicle-stimulating hormone receptor polymorphism and ovarian function. *Gynecologie, Obstetrique and Fertilité* 2007; 35(2): 135-41.
31. Dieamant F, Petersen CG, Vagnini LD, Petersen B, Ricci J, Nicoletti A, et al. The polymorphism Ala307Thr of the follicle stimulating hormone receptor (FSHR) gene is associated with different doses of recombinant FSH received during IVF/ICSI treatment. *JBRA Assist Reprod* 2023; 27(1): 78-84.
32. Yao Y, Ma CH, Tang HL & Hu YF. Influence of follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) Ser680Asn polymorphism on ovarian function and in-vitro fertilization outcome: A meta-analysis. *Molecular Genetics and Metabolism* 2011; 103(4): 388-93.
33. Konig TE, Van-Der-Lee J, Schats R & Lambalk CB. The relationship between FSH receptor polymorphism status and IVF cycle outcome: A retrospective observational study. *Reproductive Biomedicine Online* 2019; 39(2): 231-40.
34. Ganesh V, Venkatesan V, Koshy T, Reddy SN, Muthumuthiah S & Paul SFD. Association of estrogen, progesterone and follicle stimulating hormone receptor polymorphisms with in vitro fertilization outcomes. *Systems Biology in Reproductive Medicine* 2018; 64(4): 260-5.
35. De-Castro F, Moron FJ, Montoro L, Real LM & Ruiz A. Pharmacogenetics of controlled ovarian hyperstimulation. *Pharmacogenomics* 2005; 6(6): 629-37.
36. Moron FJ & Ruiz A. Pharmacogenetics of controlled ovarian hyperstimulation: Time to corroborate the clinical utility of FSH receptor genetic markers. *Pharmacogenomics* 2010; 11(11): 1613-8.
37. Altmae S, Hovatta O, Stavreus-Evers A & Salumets A. Genetic predictors of controlled ovarian hyperstimulation: Where do we stand today? *Human Reproduction Update* 2011; 17(6): 813-28.



# Relationship between FSH Receptor's Exon 10 Polymorphisms with IVF Results in Iranian Women

Maliheh Javadi-Arjmand<sup>1</sup> (M.S.), Elia Damavandi<sup>2</sup> (M.D.), Hamid Choobineh<sup>3</sup> (Ph.D.),  
Majid Kabuli<sup>4</sup> (M.D.), Mohsen Ghadami<sup>5\*</sup> (M.D.)

1 Master of Science in Human Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Photodynamic, Medical Laser Research Center, Yara Institute, ACECR, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

## Abstract

Received: 14 Jan. 2024

Accepted: 15 May. 2024

**Background and Aim:** Follicle stimulating glycoprotein hormone (FSH) exerts its functions through its receptor (FSHR). In women of reproductive age, this hormone causes the growth and development of follicles in the ovary during the follicular phase of the menstrual cycle. This hormone is widely used in the treatment of infertility. Several polymorphisms have been reported so far in the FSHR gene, which are effective in the ovarian response, but the FSHR gene has two very common single nucleotide polymorphisms at positions 680 and 307 in exon 10. One of them at position 307 changes the amino acid threonine to alanine and the other at position 680 changes asparagine to serine. The polymorphism at position 307 of exon 10 is in the extracellular region of the receptor and the binding site of the hormone, which can be affected in response to internal and external FSH stimulation. These two SNPs have been reported to be associated with various ovarian responses and IVF outcomes in different populations. Different studies have particularly focused on rs6166 (p. Asn680Ser), but this study was conducted to investigate the possible association between rs6166 and rs6165 (p. Thr307Ala) and the IVF outcome.

**Materials and Methods:** After blood sampling and DNA extraction, the two polymorphisms in exon 10 of FSHR gene were analyzed using PCR-RFLP method in 120 women randomly assigned to two equal groups including IVF successful and IVF unsuccessful infertile women. The selection of patients to enter the study as well as the criteria for successful IVF are described in the text. In order to confirm the results, DNA sequencing was done for some selected samples. Finally, the results were analyzed using SPSS software.

**Results:** No significant differences were found in either SNPs between successful IVF and unsuccessful IVF patients in allelic frequencies ( $P$ -value>0.05).

**Conclusion:** Despite the different results of the studies conducted regarding the effect of FSHR gene polymorphisms (rs6165 and rs6166) in different populations, considering the lack of significant difference in the frequency of the above polymorphisms in the studied population, it is concluded that these two polymorphisms cannot be used to predict the outcome of IVF in Iranian infertile women.

**Keywords:** FSHR Gene, Polymorphism, In Vitro Fertilization, Infertility

\* Corresponding Author:  
Ghadami M  
Email:  
mghadami@tums.ac.ir